

49. *S. PICTA*: calycibus clavatis 10-striatis reticulatis, petalis bifidis externe colorato-lineatis, foliis lineari-lanceolatis, caule virgato glabro. *W. E.*

*Hab. in Gallia.* ☉. *D. intr.* 1800.

50. *S. PORTENSIS*: caule dichotomo paniculato, calycibus striatis, petalis bifidis, foliis linearibus. *Lin.*

*Hab. in Lusitania.* ☉. *D. intr.* 1799.

51. *S. CRETICA*: erecta lævis, calycibus erectis decemangularibus, petalis bifidis. *Lin.*

*Hab. in Creta.* ☉. *D.*

52. *S. PATULA*: viscosa, calycibus elongatis, pedunculis subtrifloris, petalis semibifidis, foliis interioribus longe petiolatis ovato-acuminatis. *Desf.*

*Atl.*

*Hab. in Barbar.* ♀. *F. D. intr.* 1810.

53. *S. MUSCIPULA*: petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus sessilibus, foliis glabris. *Lin.*

*Hab. in Hispan., Gall. austr.* ☉. *D. intr.* 1797.

†††† *Floribus terminalibus.*

54. *S. ARMERIA* *Lin.*: floribus fasciculatis fastigiatis, petalis emarginatis, foliis superioribus cordatis glabris. *Lin.*

*Hab. in Europa austr.* ☉. *D.* — *Adest var. fl. albo.*

55. *S. COMPACTA* *Fisch.*: floribus fasciculatis, petalis integris, foliis acutis glabris, superioribus ovato-lanceolatis, inferioribus oblongo-lanceolatis.

*Hab. in Russia?* ♂. *D. intr.* 1812. — *S. Armeria duplo major.*

56. *S. ORCHIDEA*: petalis bilobis, laminis basi utrinque processu subulato auctis, foliis lævibus, inferioribus subrotundo-spathulatis, petiolis ciliatis. *Ait. Kew.*

*Hab. in Oriente.* ☉. *D. intr.* 1796.

57. *S. CHLORÆFOLIA*: calycibus glabris clavatis, petalis semibifidis, foliis glaucis, inferioribus ovalibus, summis cordatis amplexicaulibus. *Smith. Ic.*

*Hab. in Armenia.* ♀. ♂. *F. intr.* 1804.